A MELHOR PROTEÇÃO É A **PREVENÇÃO**



- Aplique repelentes na pele exposta (DEET, IR3535 ou Icaridina) e reponha com frequência
- Aplique repelente na roupa (Permetrina)
- Use roupas claras e compridas
- Evitar perfumes e desodorizantes
- Evitar atividades ao ar livre durante amanhecer e o anoitecer

No estabelecimento onde estiver alojado use sempre o ar condicionado não abra as janelas. impossibilidade, as camas deverão ter redes mosquiteiras impregnadas com inseticida.



CONTACTE-NOS!

Necessita de esclarecimentos adicionais?



271 205 348



geral.usp@ulsguarda.min-saude.pt







Unidade de Saúde Pública Consulta de Medicina do Viajante

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS DENGUE





VÍRUS DO DENGUE

Doença transmitida através da picada do mosquito fêmea infetado da espécie Aedes aegypti.



A fêmea coloca os ovos em recipientes que contenham água estagnada ou salobra.




São também estes os locais de reprodução do mosquito

O mosquito é mais ativo no **início da manhã e ao anoitecer**, sendo estes os períodos de maior risco. Encontram-se predominantemente em áreas urbanas





A transmissão do dengue tem vindo a ocorrer com maior intensidade **nas Américas** (Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia) **e na Ásia** (Tailândia).







VACINAÇÃO

Desde 2023, existe uma vacina que confere proteção contra a dengue. A vacina pode ser administrada a adultos, adolescentes e crianças a partir dos 4 anos no caso de **viagens** prolongadas para zonas endémicas ou no caso de surtos ativos no destino.



A DOENÇA

Os sintomas da Dengue podem incluir:

- <u>febre</u>: sintoma mais comum e que dura cerca de 2 a 7 dias
- dor de cabeça
- dor muscular e articular
- dor em redor ou atrás dos olhos
- vómitos
- manchas vermelhas na pele
- hemorragias



Os sintomas surgem entre 4 a 7 dias após a picada do mosquito e duram cerca de 7 dias.

A maioria das crianças, ou apresentam um quadro febril leve.



A Dengue **não se transmite de pessoa-a-pessoa.**

Não existe tratamento específico para a doença

Se sentir que está doente, **não tome**medicamentos com ácido salicílico (ex.:
Aspirina®) pois aumenta o risco de hemorragia