A MELHOR PROTEÇÃO É A **PREVENÇÃO**



- Aplique repelentes na pele exposta (DEET, IR3535 ou Icaridina) e reponha com frequência
- Aplique repelente na roupa (Permetrina)
- Use roupas claras e compridas
- Evitar perfumes e desodorizantes
- Evitar atividades ao ar livre durante amanhecer e o anoitecer

No estabelecimento onde estiver alojado use sempre o ar condicionado abra as janelas. não impossibilidade, as camas deverão ter redes mosquiteiras impregnadas com inseticida.



CONTACTE-NOS!

Necessita de esclarecimentos adicionais?



geral.usp@ulsguarda.min-saude.pt













Malária

Transmitida através da picada do mosquito fêmea infetado da espécie Anopheles.

Doença causada por parasitas do género Plasmodium.




A doença prolifera nas grandes áreas tropicais e sub tropicais que propiciam a multiplicação e crescimento dos mosquitos.

O mosquito tem o seu período ativo entre o anoitecer e o nascer do sol, sendo mais encontrado em zonas rurais.



A transmissão da malária ocorre em grandes áreas de **África**, América Latina, partes das Caraíbas, Ásia, Europa de Leste e Pacífico do Sul.





A DOENÇA

O intervalo de tempo entre a picada e o aparecimento de sintomas é de, no mínimo, 7 a 8 dias, podendo demorar até 1 mês

Os sintomas da Malária podem ser muito semelhantes aos de quadro gripal:

- febre
- dor de cabeça
- dor muscular e articular
- diarreia
- vómitos



Por este motivo, deve suspeitar que está infetado com a doença se estiver numa região de alto risco ou se tiver **regressado de viagem** de uma destas regiões, devendo procurar imediatamente ajuda médica.

QUIMIOPROFILAXIA



É uma medida essencial na prevenção da doença.

Pressupõe que o viajante tome medicação antes, durante e depois da exposição.

A medicação escolhida será sempre adaptada ao tipo e duração de viagem, bem como às características do viajante.

